

Лечения остеохондроза методом доктора Попова



Виды остеохондроза к которым применим метод

- **Шейный.** Наиболее опасный, потому что через шейный отдел проходят основные артерии, питающие мозг. Лечение шейного остеохондроза необходимо начинать незамедлительно. По методики [доктора Попова](#)
- **Грудной.** Редкий вид по сравнению с другими. Симптоматика схожа с болями в сердце. Однако при принятии сердечных лекарств боль не утихает.
- **Поясничный** остеохондроз. Самый часто встречающийся, потому что именно поясничный отдел принимает на себя основную нагрузку верхней части тела.
- **Распространенный.** Возникает при поражении сразу двух и более отделов позвоночника.

Стадии остеохондроза



Подход к лечению

В нашем случае, остеохондроз входит в перечень методов лечения доктора [Попова Константина Ивановича](#). Доктор Попов обладает способностью, используя пальцы и кисти рук, при наложении на больную область, разрушать солевые отложения суставов (кальциевые - остеофиты и соли мочевой кислоты). Причём процедура охватывает все отделы позвоночника, а не отдельные части.

Методика заключается в рефлексотерапии с использованием вибрации пальцами и кистями рук, с определённой частотой, амплитудой и временем воздействия. Обладая даром сверхчувствительности, доктор Попов, при наложении рук находит место воспалительного процесса - интуитивно. Действие целителя носит мягкий, щадящий характер. Исключается резкая боль.

Берётся во внимание вся проблемная зона, начиная от первого шейного позвонка до 4-5 поясничных, в т.ч. крестца, который представляет собой костное образование, состоящее из пяти неподвижно соединенных позвонков и соединяющие поясничный отдел

позвоночника, копчик и тазовые кости. Внимание уделяется месту, где ощущаются болевой синдром.

В процессе проведения процедур, болевые ощущения затихают до полного исчезновения. Пациент, при таких ощущениях, полностью доверяет методу лечения целителя. Это является залогом успешного завершения лечения. В конечном итоге, метод позволяет восстановить объём синовиальной жидкости в межпозвоночных дисках при грыжах. Паравертебральное воздействие снижает риск возникновения протрузий и уже, имеющихся разрастаний.

После первой процедуры больной ощущает облегчение. После нескольких процедур наблюдается появление подвижности суставов позвонков. Высвобождаются сжатые нервные корешки (радикулиты). Исчезает временный (функциональный) рефлекторный сколиоз обусловленный высоким тонусом мышц с поражённой стороны. В итоге, у пациента улучшается настроение.

Методы диагностики, такие как МРТ, КТ оказывают угнетающие воздействие на пациентов. Ухудшают материальное положение. Пациенты не видят перспективы в решении данной проблемы: возникает депрессия. В предложенном методе лечения, пациент избегает лишних расходов и потери времени. На приёме оказывается доброе и внимательное отношение к каждому.

Р. S. В данном методе учитывается исправление прогрессирующего сколиоза детей и взрослых, как предвестник будущих проблем. Многолетняя практика доказывает эффективность метода [доктора Попова](#) в формировании правильной осанки и деформации грудной клетки.

Проведения процедур способствует уменьшению объёмов по все всему периметру тела: окружность подмышечной части, окружность в области тазобедренных суставов и окружности в области бёдер, с последующим уменьшением массы тела, повышается иммунитет, уменьшается потливость.

Обращение по адресу:

г. Тула, ул. Макаренко, д. 14, домофон 4, офис 9

Тел. : +7 (905) 117-95-59, +7 (905) 622-87-91

Прием взрослых и детей.

Консультационный осмотр пациента и диагностирование 1500 руб.

